



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

Departamento de Clínica Médica

REUNIÃO CLÍNICA

ANO: 2023

Número: 01

Data: 10/03/2023 **Local:** Anfiteatro do CEAPS
Horário: 7h30 **Modalidade:** Discussão de Caso Clínico
Relatora: Profa. Dra. Léa Maria Zanini Maciel

Identificação: NPME, 66 anos, casada, feminina, branca,, natural de Potirendaba – SP e procedente de Ribeirão Preto – SP.

Caso Novo na Endocrinologia em 23/03/2005

QD: Rouquidão e distúrbio de equilíbrio há 2 anos.

HMA: Paciente refere que em 2002 foi submetida à cirurgia de câncer de mama e, após à radioterapia, finalizada em abril/2003, começou a apresentar rouquidão, sendo avaliada por dois OTRs, sem solução. Ao mesmo tempo refere dificuldade para andar, com passos curtos e fraqueza. Refere constipação crônica, com piora nos últimos anos, ficando 12 dias sem evacuar. Refere também pele e cabelos muito secos, olhos muito secos, queda de cabelos e zumbido “pulsátil” em ouvidos. Refere edema de face e membros, mas não sabe dizer desde quando, provavelmente desde 2003. Nega artralguas, alteração de memória e sonolência.

Queixa-se de perda de peso por anorexia e dificuldade de digestão com náuseas frequentes.

IDA: sem dados relevantes

AP: Malária aos 9-10 anos,
Cirurgia de hérnia de disco em 1983
Histerectomia por miomatose uterina aos 42 anos de idade
Câncer de mama operado em 2002
Gesta 6 para 7 – (1 parto gemelar)
Refere uma transfusão de sangue em ???

Medicações em uso: Complexo B

AF: Pai falecido de “velhice” aos 92 anos (doença de Alzheimer).

Mãe falecida de câncer gástrico

6 irmãos vivos

Filhos saudáveis

Não sabe referir sobre doenças da tireoide na família

EF:

Peso: 64,3 kg, Estatura:?

BEG, hidratada, afebril, eupneica.

Fácies mixedematosa. Fala lenta e rouca. Dificuldade na articulação das palavras.

Movimentos lentos.

Pele seca generalizada. Edema nas mãos e pés

Pescoço: não palpo tireoide.

Coração: 2BRNF, sem sopros. FC = 80 bpm. PA = 90 x 60 mmHg.

Pulmões: MV presente e simétrico sem ruídos adventícios.

Abdome globoso e normotenso. Fígado a 2 cm do RCD, indolor. Baço não palpável.

MMII: com edema nos pés não depressível.